



**MIMPARA®** Este medicamento contiene lactosa.

**(cinacalcet)**

## ¿Qué es CINACALCET?

Medicamento indicado en el tratamiento del hiperparatiroidismo secundario en pacientes con insuficiencia renal crónica en diálisis.

-Actúa controlando los niveles de hormona paratiroidea, calcio y fósforo anormalmente elevados debido a su enfermedad renal.

## ¿Qué dosis debo tomar?

-Su médico le indicará la dosis.

## ¿Cómo debería tomar CINACALCET?

-Mimpara® se presenta en forma de comprimidos recubiertos con película para administrar por la boca.

-Debe tomarse con las comida o poco después de comer.

-Los comprimidos deben ingerirse enteros y no deben partirse.

## ¿Qué hago si olvido una dosis?

Si ha olvidado tomar una dosis, tome la dosis siguiente a la hora habitual.

-No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

## ¿Qué debe contarle a su médico y farmacéutico antes de empezar el tratamiento?

Historial de alergia a CINACALCET o alguno de sus excipientes.

Si tiene antecedentes de convulsiones.

Si empieza o deja de fumar.

Si padece intolerancia a algún azúcar.

## ¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

\* Muy frecuentes: náuseas, vómitos.

\* Frecuentes:

- Mareo.

- Sensación de hormigueo.

- Pérdida de apetito

- Dolor muscular, debilidad.
- Erupción cutánea

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico.

### ¿CINACALCET puede interaccionar con otros medicamentos?

Debe informar a su médico y farmacéutico de toda la medicación y productos naturales que tome. Algunos de los medicamentos que producen interacciones con CINACALCET son:

- medicamentos que reducen el calcio sérico: puede provocar un mayor riesgo de hipocalcemia

### ¿Cómo debo conservar CINACALCET?

Conservar a temperatura ambiente (entre 15°C y 30°C), alejado de la humedad, el calor y la luz. Debe conservar los comprimidos en el envase original.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en la caja después de "CAD". La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

En el caso de que le sobre medicación, devuélvala lo antes posible al Servicio de Farmacia de su Hospital.

### Precauciones

Debe informar a su médico:

- si nota entumecimiento u hormigueo alrededor de la boca, dolores musculares o calambres y convulsiones.

### Embarazo:

Mimpara debe administrarse durante el embarazo sólo si el beneficio potencial justifica el riesgo potencial para el feto.

Después de una valoración detenida de la relación beneficio/riesgo, se debe decidir si suspender la lactancia o interrumpir el tratamiento con Mimpara.

### Recomendaciones generales

-En caso de interrupción del tratamiento, no tire la medicación a la basura. Los comprimidos sobrantes serán devueltos al Servicio de Farmacia.

-Mantenga este medicamento fuera del alcance de los niños.

**HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES DE GRANADA**  
**Avenida de las Fuerzas Armadas, 2**  
**18014, Granada**

**Tlf: 958 020 000**