



EXVIERA

DASABUVIR

Qué es Exviera y para qué se utiliza?

Exviera es un medicamento antivírico utilizado en adultos, en combinación con otros medicamentos, para tratar la hepatitis C crónica (de larga duración), una enfermedad infecciosa del hígado causada por el virus de la hepatitis C.

Contiene el principio activo DASABUVIR.

¿Cómo se usa Exviera?

Exviera solo se podrá dispensar en el Servicio de Farmacia de su Hospital y el tratamiento deberá iniciarlo y supervisarlo un médico con experiencia en el tratamiento de pacientes con hepatitis C crónica.

Exviera se presenta en forma de comprimidos de 250 mg y la dosis recomendada es de dos comprimidos al día, uno por la mañana y otro por la noche **con alimentos**

Exviera se utiliza siempre en combinación con otro medicamento, Viekirax, que contiene los principios activos ombitasvir, paritaprevir y ritonavir. Algunos pacientes que toman Exviera se tratan también con otro medicamento antivírico, la ribavirina, además de Viekirax. Se conocen diversos genotipos del virus de la hepatitis C, de manera que la combinación de medicamentos utilizada y la duración del tratamiento dependerá del genotipo concreto del virus con el que el paciente esté infectado y del tipo de problemas de hígado que tenga, por ejemplo, si padece cirrosis hepática (fibrosis del hígado) o si el hígado no le funciona adecuadamente. Para más información, consulte el prospecto.

¿QUÉ DEBERÍA HACER SI OLVIDO TOMAR UNA DOSIS?

Si se omite una dosis de Exviera debe tomar la dosis olvidada en un plazo de 6 horas. Si han pasado más de 6 horas después de la hora habitual de la toma de Exviera, NO debe tomar la dosis omitida y debe reanudar la toma a la hora habitual prevista. Se debe indicar a los pacientes que no tomen una dosis doble.

¿Cuál es el riesgo asociado a Exviera?

Los efectos adversos más frecuentes de Exviera cuando se utiliza con Viekirax y ribavirina (observados en más de 1 de un paciente de cada 10) son insomnio, náuseas,

prurito (picor), astenia (debilidad) y fatiga (cansancio). Para consultar la lista completa de efectos adversos, ver el prospecto.

Exviera no debe administrarse a mujeres que tomen etinilestradiol, un estrógeno que se encuentran en los anticonceptivos hormonales. Tampoco debe utilizarse junto con otros medicamentos antes de tomar alguna medicación consultar a su médico porque existen muchas interacciones.

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES DE GRANADA

Avenida de las Fuerzas Armadas, 2

18014, Granada

Tlf: 958 020 000