



### ¿Qué es **FAMPRIDINA**?

Es un medicamento que se utiliza para mejorar la marcha en pacientes adultos con esclerosis múltiple con discapacidad en la marcha.



### ¿Qué dosis debo tomar?

Debe tomar un comprimido dos veces al día:

Horario																		
6	7		9	10	11	12	13		15	16	17	18	19	20		22		24

### ¿Cómo debería tomar **FAMPRIDINA**?

Deberá tomar la dosis indicada **sin alimentos dos veces al día.**

No fraccione ni mastique los comprimidos.

### ¿Qué hago si olvido una dosis?

**No tome la dosis olvidada, y continúe su tratamiento con normalidad.**

**En caso de vómito,** tómela si ha pasado menos de 30 minutos desde que ha tomado el medicamento

### ¿Qué debe contarle a su médico y farmacéutico antes de empezar el tratamiento?

- Historial de alergia a Fampridina a alguno de sus excipientes
- Historial de enfermedad renal, cardíaca, infecciones y crisis epilépticas.
- Embarazo y/o lactancia.

### ¿Qué efectos adversos puedo tener?

- Muy frecuentes (1 de cada 10 personas):
  - o Aumento de infecciones (dolor de garganta, escozor al orinar).
- Frecuentes (5 de cada 100 personas):
  - o Mareo, ansiedad e insomnio, náuseas, vómitos, estreñimiento, dolor de cabeza y óseo/muscular y sensación de hormigueo.
- Graves (menos de 1 de cada 1000 personas):
  - o Crisis epilépticas y reacciones alérgicas

Podemos aliviar algunos de estos síntomas siguiendo las instrucciones de la hoja “¿Qué hago si....?”

### ¿FAMPRIDINA puede interaccionar con otros medicamentos?

Debe informar a su médico y farmacéutico de toda la medicación y productos naturales que tome. Algunos de los medicamentos que producen interacciones con fampridina son:


### ¿Cómo debo conservar FAMPRIDINA?

- A temperatura ambiente, alejado de la humedad, del calor y la luz. Debe conservar los comprimidos en el envase original.
- En el caso de que le sobre medicación, devuélvala lo antes posible al Servicio de Farmacia de su Hospital.
- No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en la caja, la funda protectora y el estuche después de "CAD". La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

### Observaciones:

Este medicamento puede hacerle sentirse mareado o sin equilibrio durante las primeras 4-8 semanas de tratamiento. Si utiliza algún soporte para caminar, como por ejemplo un bastón, deberá seguir utilizándolo.

Se debe evaluar la eficacia de Fampridina a las dos semanas de tratamiento, y suspender el tratamiento si no se observa mejoría.

**HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES DE GRANADA**

**Avenida de las Fuerzas Armadas, 2**

**18014, Granada**

**Tlf: 958 020 000**