

¿Qué es **INTERFERON BETA 1-a (REBIF®)**?

Es un inmunomodulador, utilizado en tratamiento modificador del curso de la **esclerosis múltiple remitente-recidivante** (aumentando el tiempo entre brotes)



¿Qué dosis debo administrarme?

Debe administrarse:

Excipientes: Alcohol bencílico

Horario						
Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo


Un vial tres veces por semana

¿Cómo debería tomar **INTERFERON BETA 1-a (REBIF®)**?

Se administra por vía subcutánea, en el tejido justo debajo de la piel mediante un dispositivo electrónico llamado REBISMART.

Se deben alternar las zonas de inyección. Las más adecuadas son:

- Parte posterior de los brazos.
- Abdomen
- Parte exterior de los muslos



¿Qué hago si olvido una dosis?

Póngasela lo antes posible, y continúe su tratamiento con normalidad (no utilice dos dosis el mismo día).

¿Qué debe contarle a su médico y farmacéutico antes de empezar el tratamiento?

- Historial de alergia a Interferón beta o alguno de sus excipientes.
- Historial de enfermedad renal, cardíaca, hepática, epilepsia o depresión.
- Antes de administrar vacunas por riesgo aumentado de infección.
- Embarazo y/o lactancia.

¿Qué efectos adversos puedo tener?

- Muy frecuentes (1 de cada 10 personas):
 - o Síntomas pseudogripales (malestar general).
- Frecuentes (5 de cada 100 personas):
 - o Depresión, insomnio, reacciones cutáneas. picor, dolor óseo/muscular, diarrea y náuseas.
- Graves (menos de 1 de cada 1000 personas):
 - o Ideas suicidas, fallo hepático, púrpura trombótica y síndrome nefrótico.

Podemos aliviar algunos de estos síntomas siguiendo las instrucciones de la hoja “¿Qué hago si....?”

¿INTERFERON BETA 1-a puede interaccionar con otros medicamentos?

Debe informar a su médico y farmacéutico de toda la medicación y productos naturales que tome. Algunos de los medicamentos que producen interacciones con interferón beta 1-a son:

¿Cómo debo conservar INTERFERON BETA?

- Se debe conservar en nevera (2-8°C). NUNCA EN CONGELADOR. Debe conservar el fármaco en el envase original.
- En el caso de que le sobre medicación, devuélvala lo antes posible al Servicio de Farmacia de su Hospital.
- No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en la caja, la funda protectora y el estuche después de "CAD". La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Observaciones:

- Para aliviar los síntomas pseudogripales, puede tomar paracetamol 0,5-1g antes de la administración, y cada 8 horas en las siguientes 24-48h.

- Contacte con su médico si: presenta hinchazón de cara y/o lengua o dificultad al respirar (posible reacción alérgica), se siente más triste o tiene ideas de suicidio, aparecen cardenales, sangra con facilidad o contrae muchas infecciones, amarillento en piel u ojos, aceleración en los latidos de corazón, hinchazón en tobillos o piernas, dolor en el vientre que se irradia hacia la espalda, mareos o fiebre

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES DE GRANADA

**Avenida de las Fuerzas Armadas, 2
18014, Granada**

Tif: 958 020 000