



## VIEKIRAX OMBITASVIR/PARITAPREVIR/RITONAVIR

### ¿Qué es VIEKIRAX y para qué se utiliza?

VIEKIRAX es un medicamento antivírico utilizado en adultos, en combinación con otros medicamentos, para tratar la hepatitis C crónica (de larga duración), una enfermedad infecciosa del hígado causada por el virus de la hepatitis C.

Contiene tres principios activos: OMBITASVIR, PARITAPREVIR Y RITONAVIR.

### ¿Cómo se usa VIEKIRAX?

Viekirax solo se podrá dispensar en el Servicio de Farmacia de su Hospital con su informe médico y el tratamiento deberá iniciarlo y supervisarlo un médico con experiencia en el tratamiento de pacientes con hepatitis C crónica.

Viekirax se presenta en forma de comprimidos que contienen 12,5 mg de ombitasvir, 75 mg de paritaprevir y 50 mg de ritonavir.

La dosis recomendada es de **dos comprimidos una vez al día tomados con alimentos** sin tener en cuenta el contenido de grasas o de calorías. Se debe tomar el comprimido entero sin masticar, machacar o disolver.

Viekirax se utiliza siempre en combinación con otros medicamentos para la hepatitis C crónica, como dasabuvir y ribavirina.

Se conocen diversos genotipos del virus de la hepatitis C, de manera que la combinación de medicamentos utilizada y la duración del tratamiento dependerá del genotipo concreto del virus con el que el paciente esté infectado y del tipo de problemas de hígado que tenga.

### ¿Cómo actúa Viekirax?

Los tres principios activos de Viekirax actúan de distintas formas: el ombitasvir bloquea la actividad de una proteína del virus de la hepatitis C denominada NS5A/4A y el paritaprevir bloquea la acción de otra proteína denominada NS3/4A, ambas necesarias para que el virus se multiplique. Al bloquear estas proteínas, el medicamento impide la multiplicación del virus de la hepatitis C y la infección de nuevas células.

El tercer principio activo, el ritonavir, no actúa directamente contra el virus de la hepatitis C, pero bloquea la acción de una enzima denominada CYP3A que degrada el paritaprevir. La inhibición de la CYP3A reduce la velocidad con la que el paritaprevir se elimina del organismo, lo que permite que actúe contra el virus durante más tiempo.

Viekirax ha demostrado ser eficaz frente a los genotipos 1a y 1b y el genotipo 4.

### **¿QUÉ DEBERÍA HACER SI OLVIDO TOMAR UNA DOSIS?**

Si se omite una dosis de Viekirax el paciente debe tomar la dosis prescrita en un plazo de 12 horas. Si han pasado más de 12 horas después de la hora habitual de la toma de Viekirax, el paciente NO debe tomar la dosis omitida y debe reanudar la toma a la hora habitual prevista. Se debe indicar a los pacientes que no tomen una dosis doble.

### **¿Cuál es el riesgo asociado a Viekirax?**

Los efectos adversos más frecuentes de Viekirax en combinación con dasabuvir y ribavirina (observados en más de 1 de un paciente de cada 10) son insomnio, náuseas, prurito (picor), astenia (debilidad) y fatiga (cansancio). Para consultar la lista completa de efectos adversos, ver el prospecto.

Viekirax no debe administrarse a pacientes con insuficiencia hepática grave ni a mujeres que tomen etinilestradiol, un estrógeno que se encuentra en los anticonceptivos hormonales. Tampoco debe utilizarse junto con medicamentos que afecten a la actividad de ciertas enzimas que pueden aumentar o reducir los niveles de sus principios activos en la sangre. La lista completa de restricciones puede consultarse en el prospecto.

**HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES DE GRANADA**

**Avenida de las Fuerzas Armadas, 2**

**18014, Granada**

**Tlf: 958 020 000**