



Junta de Andalucía

Consejería de Salud y Familias

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD



ZYTIGA®

(abiraterona)



Este medicamento contiene **sodio** (27 mg dosis diaria) y **lactosa**.

¿Qué es ABIRATERONA?

Es un medicamento indicado en el tratamiento de ciertos tumores de próstata. Cuando tome este medicamento, su médico le recetará además otro medicamento llamado **prednisona o prednisolona**, para disminuir la posibilidad de sufrir un aumento de la tensión arterial, que acumule demasiada cantidad de agua en su cuerpo (retención de líquidos) o que disminuya los niveles de una sustancia química llamada potasio en su sangre.

¿Qué dosis debo tomar?

-Su médico le indicará la dosis y el número de comprimidos que usted tiene que tomar. La dosis habitual es **1.000 mg/día** (2 comprimidos de 500 mg).

¿Cómo debería tomar ABIRATERONA?

-Deberá tomar la dosis indicada **una vez al día**.

-Los comprimidos deben tomarse en **ayunas**, es decir, 1 hora antes o 2 horas después de las comidas.

-Debe tomar los comprimidos **enteros con agua**, uno tras otro y es importante que los tome todos los días a la misma hora.

¿Qué hago si olvido una dosis?

-Si olvida tomar Abiraterona, tome la medicación tan pronto como sea posible, excepto si se encuentra ya próximo a la toma de la siguiente dosis. Nunca se tome una dosis doble para compensar un olvido.

¿Qué debe contarle a su médico y farmacéutico antes de empezar el tratamiento?

- Historial de alergia a ABIRATERONA o alguno de sus excipientes.
- Historial de enfermedad hepática.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

-Alteraciones en las pruebas hepáticas: aumento de las enzimas hepáticas y posible alteración de los valores en las analíticas.

-Alteraciones cardíacas: es poco frecuente, pero puede aparecer alteración del ritmo cardíaco, con palpitaciones, y tener sensación de falta de aire (disnea).

-Riesgo de fracturas óseas.

-Hipertensión arterial.

-Retención de líquidos en las extremidades y disminución de potasio en sangre. -Infecciones urinarias.

¿ABIRATERONA puede interaccionar con otros medicamentos?

Debe informar a su médico y farmacéutico de toda la medicación y productos naturales que tome. Algunos de los medicamentos que producen interacciones con ABIRATERONA son:

- fenitoína, carbamazepina, rifampicina, rifabutina, fenobarbital
- Hierba de San Juan

¿Cómo debo conservar ABIRATERONA?

Conservar a temperatura ambiente (entre 15°C y 30°C), alejado de la humedad, el calor y la luz. Debe conservar los comprimidos en el envase original.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en la caja después de "CAD".

La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

En el caso de que le sobre medicación, devuélvala lo antes posible al Servicio de Farmacia de su Hospital.

Precauciones

-Evite actividades que puedan ocasionarle caídas.

-Controle su tensión arterial de forma periódica.

-Acuda a su médico si experimenta palpitaciones intensas y sensación de falta de aire. Debilidad muscular y contracciones involuntarias debidas a la disminución de potasio. Picor, ojos o piel amarillentos, orina oscura y dolor o malestar en la parte superior derecha del estómago.

Embarazo: ABIRATERONA **no** está indicado en mujeres.

Si mantiene relaciones sexuales con una mujer en edad fértil, debe utilizar un preservativo y otro método anticonceptivo eficaz.

Recomendaciones generales

-En caso de interrupción del tratamiento, no tire la medicación a la basura. Los comprimidos sobrantes serán devueltos al Servicio de Farmacia.

-Mantenga este medicamento fuera del alcance de los niños.

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES DE GRANADA

Avenida de las Fuerzas Armadas, 2

18014, Granada

Tlf: 958 020 000

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES DE GRANADA

**Avenida de las Fuerzas Armadas, 2
18014, Granada**

Tlf: 958 020 000