



XTANDI®

(enzalutamida)

¿Qué es ENZALUTAMIDA?

Es un medicamento indicado en el tratamiento de hombres adultos con cáncer de próstata metastático.

¿Qué dosis debo tomar?

- Su médico le indicará la dosis y el número de comprimidos que usted tiene que tomar.
- La dosis recomendada es de 160 mg de enzalutamida (cuatro cápsulas de 40 mg) en una sola dosis diaria oral.

¿Cómo debería tomar ENZALUTAMIDA?

- Deberá tomar la dosis indicada **una vez al día**.
- Los comprimidos se deben **tragar enteros** con agua y se pueden tomar **con o sin alimentos**.
- El cáncer de la próstata es a veces tratado con una combinación de medicamentos. Use todos sus medicamentos como le indique su médico.

¿Qué hago si olvido una dosis?

- Si olvida tomar enzalutamida, tome la medicación tan pronto como sea posible, excepto si se encuentra ya próximo a la toma de la siguiente dosis. Nunca se tome una dosis doble para compensar un olvido.

¿Qué debe contarle a su médico y farmacéutico antes de empezar el tratamiento?

Historial de alergia a ENZALUTAMIDA o alguno de sus excipientes.

Historia de crisis epilépticas.

Enfermedad cardiovascular reciente.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

- Las reacciones adversas más frecuentes son astenia/fatiga, sofocos, cefalea e hipertensión.
- Otras reacciones adversas importantes incluyen, caídas, fracturas no patológicas, trastorno cognoscitivo y neutropenia.

¿ENZALUTAMIDA puede interaccionar con otros medicamentos?

Debe informar a su médico y farmacéutico de toda la medicación y productos naturales que tome. Algunos de los medicamentos que producen interacciones con ENZALUTAMIDA son:

- Analgésicos (p. ej. fentanilo, tramadol)
- Antibióticos (p. ej. claritromicina, doxiciclina)
- Agentes anticancerosos (p. ej. cabazitaxel)
- Anticoagulantes (p. ej. acenocumarol, warfarina)
- Antiepilépticos (p. ej. carbamazepina, clonazepam, fenitoína, primidona, ácido valproico).
- Antipsicóticos (p. ej. haloperidol)
- Betabloqueantes (p. ej. bisoprolol, propranolol)
- Antagonistas del canal del calcio (p. ej. diltiazem, felodipino, nicardipino, nifedipino, verapamilo)
- Glucósidos cardíacos (p. ej. digoxina)
- Corticoides (p. ej. dexametasona, prednisolona)
- Antivirales frente al VIH (p. ej. indinavir, ritonavir)
- Hipnóticos (p. ej. diazepam, midazolam, zolpidem)
- Estatinas metabolizadas por el CYP3A4 (p. ej. atorvastatina, simvastatina)
- Medicamentos tiroideos (p. ej. levotiroxina)

¿Cómo debo conservar ENZALUTAMIDA?

Conservar a temperatura ambiente (entre 15°C y 30°C), alejado de la humedad, el calor y la luz. Debe conservar los comprimidos en el envase original.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en la caja después de "CAD".

La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

En el caso de que le sobre medicación, devuélvala lo antes posible al Servicio de Farmacia de su Hospital.

Precauciones

-ENZALUTAMIDA contiene sorbitol (E420). Los pacientes con **intolerancia hereditaria a la fructosa** no deben tomar este medicamento.

Embarazo: Enzalutamida no está indicado en mujeres.

– Adopte medidas anticonceptivas de barrera si su pareja puede quedarse o está embarazada y manténgalas hasta 3 meses después de haber finalizado el tratamiento.

Recomendaciones generales

- En caso de interrupción del tratamiento, no tire la medicación a la basura. Los comprimidos sobrantes serán devueltos al Servicio de Farmacia.
- Mantenga este medicamento fuera del alcance de los niños.

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES DE GRANADA

Avenida de las Fuerzas Armadas, 2

18014, Granada

Tlf: 958 020 000