

¿Qué es SELPERCATINIB?

Es un antineoplásico (inhibidor de las protein quinasas), que suprime el crecimiento tumoral, utilizado en el tratamiento del cáncer de pulmón y cáncer de tiroides que presentan una mutación del gen RET.



¿Qué dosis debo tomar?

La dosis que su médico le indicará dependerá de su peso.

Si pesa menos de 50 kg tomará 120 mg dos veces al día. Esto equivale a 3 cápsulas de 40 mg o 1 cápsulas de 40 mg más una de 80 mg.

Si pesa 50 kg o más, tomará 160 mg dos veces al día. Esto equivale a 4 cápsulas de 40 mg o 2 cápsulas de 80 mg.

Horario																		
6	7		9	10	11	12	13		15	16	17	18	19	20		22		24

¿Cómo debería tomar SELPERCATINIB?

Deberá tomar la dosis indicada **con o sin alimentos** dos veces al día, procurando que sea siempre a las mismas horas.

La cápsula se debe tragar entera, no fraccione, triture ni mastique las cápsulas.

Si toma **inhibidor de la bomba de protones** (omeprazol, pantoprazol, lansoprazol y rabeprazol) deberá tomar selpercatinib después de una comida.

Si toma **famotidina** deberá tomar selpercatinib 2 horas antes o 10 horas después de famotidina.

¿Qué hago si olvido una dosis?

No tome la dosis olvidada, y continúe su tratamiento con normalidad.

En caso de vómito, NO tome otra dosis ese día, y continúe su tratamiento con normalidad.

¿Qué debe contarle a su médico y farmacéutico antes de empezar el tratamiento?

- ☐ Si es alérgico a selpercatinib o alguno de sus excipientes.
- ☐ Historial de enfermedad hepática, cardíaca o hipertensión.
- ☐ Antes de administrar cualquier vacuna consulte con su farmacéutico.
- ☐ Embarazo y lactancia

¿Qué efectos adversos puedo tener?

- Muy frecuentes (1 de cada 10 personas):
 - **Diarrea, náuseas, sequedad de boca**, vómitos, disminución del apetito, **dolor abdominal** o **estreñimiento**.
 - Infecciones, disminución de plaquetas y de defensas, disminución de magnesio en sangre, aumento de la creatinina y de transaminasas hepáticas.
 - Alteración del electrocardiograma y **aumento de la tensión arterial**.
 - Caída del cabello y **erupción cutánea** o picores.
 - **Cansancio**, febrícula, **hinchazón de piernas (edema)**, mareo, **dolor de cabeza**.
- Frecuentes (5 de cada 100 personas):
 - Aumento del riesgo de sangrado.
 - Hipersensibilidad
- Graves (menos de 1 de cada 1000 personas):
 - Neumonitis/ enfermedad pulmonar intersticial

Podemos aliviar algunos de estos síntomas siguiendo las instrucciones de la hoja “¿Qué hago si?”

¿SELPERCATINIB puede interaccionar con otros medicamentos?

Debe informar a su médico y farmacéutico de toda la medicación y productos naturales que tome. Algunos de los medicamentos que producen interacciones con selpercatinib son:

Algunos antibióticos (claritromicina o rifampicina), antiepilépticos (como carbamacepina, fenitoína), antifúngicos (como itraconazol, posaconazol, ketoconazol, voriconazol) y antivirales.
Inhibidores de la bomba de protones (omeprazol, pantoprazol, lansoprazol y rabeprazol) y famotidina
Hierba de San Juan (Hipérico)
Repaglinida, selexipag, montelukast, torasemida, enzalutamida, paclitaxel, sorafenib o buprenorfina.
Midazolam, simvastatina, naloxegol, ebastina, lovastatina, darunavir, buspirona.
Otros medicamentos como: dabigatrán, digoxina, saxagliptina, colchicina y fexofenadina.

¿Cómo debo conservar SELPERCATINIB?

A temperatura ambiente, alejado de la humedad, el calor y la luz. Debe conservar los comprimidos en el envase original.

En el caso de que le sobre medicación, devuélvala lo antes posible al Servicio de Farmacia de su Hospital.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en la caja después de "CAD". La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.